

**KELUHAN GEJALA RETINOPATI HIPERTENSI PADA
PENDERITA HIPERTENSI DI WIIAYAH KERJA
PUSKESMAS BANJARWANGI
KABUPATEN GARUT**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Keperawatan**

ANDRI GUNAWAN

10118021



**PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA
TAHUN
2021**

**KELUHAN GEJALA RETINOPATI HIPERTENSI PADA
PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS BANJARWANGI
KABUPATEN GARUT**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
DIII Keperawatan**

ANDRI GUNAWAN

NIM 10118049

**PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA**

2021

KELUHAN GEJALA RETINOPATI HIPERTENSI PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJARWANGI KABUPATEN GARUT

Andri Gunawan

Prodi D-III Keperawatan STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya
Jl. Cilolohan No. 36 Tasikmalaya
Email: andriiGUNAWAN6@gmail.com

Abstrak

Retinopati hipertensi terjadi karena kerusakan retina atau peredaran darah di sekitar retina yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui keluhan gejala retinopati hipertensi pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Banjarwangi Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Banjarwangi Kabupaten Garut, teknik sample menggunakan *accidental sampling* menggunakan kuesioner. Responden yang diperoleh dari rentang dua minggu sebanyak 44 responden. Hasil penelitian yang mempunyai keluhan gejala retinopati, yang mengalami keluhan sakit kepala sebanyak 25 responden (56,8%), yang mengalami keluhan pandangan tidak jelas sebanyak 34 responden (77,3%), yang mengalami keluhan mata merah sebanyak 32 responden (72,7%) , yang mengalami keluhan pandangan terbatas sebanyak 31 responden (70,5%), yang mengalami keluhan melihat floaters/bayangan sebanyak 18 responden (40,9%), responden yang mengalami keluhan melihat kilatan-kilatan cahaya sebanyak 27 responden (61,4%), responden yang mengalami keluhan melihat kilatan-kilatan cahaya sebanyak 27 responden (61,4%), yang mengalami keluhan sensitif pada cahaya sebanyak 26 orang responden (59,1%) dan yang mengalami keluhan sulit membedakan cahaya sebanyak 27 responden (61,4%).

Kata kunci: Keluhan gejala retinopati hipertensi

Abstract

Hypertensive retinopathy occurs due to damage to the retina or blood circulation around the retina caused by high blood pressure. This study aims to determine the symptoms of hypertensive retinopathy in patients with hypertension in the working area of the Banjarwangi Public Health Center, Garut Regency. This research method uses quantitative methods with a population of hypertension sufferers in the working area of the Banjarwangi Health Center, Garut Regency, the sample technique uses accidental sampling using a questionnaire. Respondents obtained from the span of two weeks as many as 44 respondents. The results of the study who had complaints of retinopathy symptoms, who experienced complaints of headaches were 25 respondents (56.8%), who experienced complaints of blurred vision as many as 34 respondents (77.3%), who experienced complaints of red eyes as many as 32 respondents (72, 7%), who experienced complaints of limited vision as many as 31 respondents (70.5%), who experienced complaints of seeing floaters/shadows as many as 18 respondents (40.9%), respondents who experienced complaints of seeing flashes of light as many as 27 respondents (61,4%), respondents who experience complaints of seeing flashes of light as many as 27 respondents (61.4%), who experience complaints of sensitivity to light as many as 26 respondents (59.1%) and who experience complaints of difficulty distinguishing light as many as 27 respondents (61.4%)

Keywords: Complaints of hypertensive retinopathy symptoms

