

REVIEW LITERATUR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
PERDARAHAN *POSTPARTUM*

SELI SRI MADINATUL MUNAWAROH

NIM : 10118012



PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
2021

FACTORS AFFECTING POSTPARTUM HEMORRHAGE

Seli Sri Madinatul Munawaroh¹, Etty komariah Sambas², Soni Hersoni³
Program Studi DIII Keperawatan STIKes BTH Tasikmalaya
Jl.Cilolohan Nomor 36 Tasikmalaya
Email : kwuii.selsri@gmail.com

ABSTRACT

Postpartum hemorrhage is an important cause of maternal death, especially in developing countries, one of which is Indonesia. Postpartum hemorrhage causes maternal mortality by 45%, 68-73%, the percentage of causes of maternal death in childbirth is bleeding 28%, eclampsia 24%, infection 11%, abortion 5%, obstetric embolism 3%, puerperal complications 8%, and others. 11%. Postpartum hemorrhage is blood loss of 500 ml or more during childbirth or the puerperium. The percentage of causes of maternal mortality are bleeding 28%, eclampsia 24%, infection 11%, abortion 5%, obstetric embolism 3%, puerperal complications 8%, and others 11%. The purpose of this study was to determine the factors that influence the incidence of hemorrhage postpartum. The research design used is a literature review. the number of articles obtained as many as 20 articles , articles obtained for analysis from the google scholar database as many as 18 articles, Garuda as many as 1 article, and proquest as many as 1 article, Mothers with population inclusion criteria postpartum with theofhemorrhage postpartum exclusionandmothers postpartum without complications,the search limit publication articles from 2011 to 2021. The results showed 9 article discusses the characteristics of women who experience postpartum, 11 articles about the factors that influence the incidence of postpartum hemorrhage . The conclusion of this literature review is characteristic Postpartum mothers who experience bleeding are the majority aged < 20 years and > 35 years, parity 1 and high parity more than 3, as well as mothers suffering from anemia.The factors that influence the incidence of postpartum hemorrhage are gestational distance, prolonged labor, retained placenta, birth canal laceration (birth canal tear) and history of bleeding.

Keywords: bleeding, postpartum

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERDARAHAN *POSTPARTUM*

Seli Sri Madinatul Munawaroh¹, Etty komariah Sambas², Soni Hersoni³
Program Studi DIII Keperawatan STikes BTH Tasikmalaya
Jl.Cilolohan Nomor 36 Tasikmalaya
Email : kwuii.selsri@gmail.com

ABSTRAK

Perdarahan postpartum merupakan penyebab penting kematian maternal khususnya di Negara berkembang salah satunya Indonesia. Perdarahan postpartum menyebabkan kematian ibu sebesar 45%, 68- 73%, persentase penyebab kematian ibu melahirkan yakni perdarahan 28%, eklampsia 24%, infeksi 11%, abortus 5%, emboli obstetri 3%, komplikasi puerpurium 8%, dan lain-lain 11%. Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah antara 500 ml atau lebih selama bersalin ataupun masa nifas. persentase penyebab kematian ibu melahirkan yakni perdarahan 28%, eklampsia 24%, infeksi 11%, abortus 5%, emboli obstetri 3%, komplikasi puerpurium 8%, dan lain-lain 11%.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian perdarahn postpartum. Desain penelitian yang digunakan adalah review literatur. jumlah artikel yang diperoleh sebanyak 20 artikel , artikel yang diperoleh untuk dianalisis dari database google scholar sebanyak 18 artikel, Garuda sebanyak 1 .artikel, dan proquest sebanyak 1 artikel, dengan kriteria inklusi populasi Ibu postpartum dengan perdarahan postpartum dan eklusi ibu postpartum tanpa komplikasi,Batas pencarian publikasi artikel dari tahun 2011 sampai 2021. Hasil penelitian menunjukkan 9 artikel membahas mengenai karakteristik ibu yang megalami postpartum ,11 artikel mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum . Kesimpulan review literatur ini adalah karakteristik ibu postpartum yang mengalami perdarahan adalah mayoritas usia < 20 tahun dan > 35 tahun, paritas 1 dan paritas tinggi lebih dari 3, serta ibu yang menderita anemia.,Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum adalah jarak kehamilan,partus lama, retensio plasenta, laseri jalan lahir (robekan jalan lahir) dan riwayat Perdarahan.

Kata kunci : perdarahan,postpartum