

**GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL
TRIMESTER III DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS TAMANSARI**

KARYA TULIS ILMIAH



Disusun Oleh :
TASYA WIDYA SALSABILA
10119099

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2022

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2022

Tasya Widya Salsabila

Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya

xv + 74 halaman + 5 tabel + 1 bagan + 11 lampiran

ABSTRAK

Kehamilan dan persalinan merupakan ancaman kedewasaan yang dapat menimbulkan kecemasan dan stress. Saat stress, janin menyerap hormon *kortisol*, yang diproduksi oleh tubuh ibu hamil. Dan anak-anak dengan kadar *kortisol* tinggi lebih mungkin mengembangkan alergi daripada anak-anak dengan kadar *kortisol* rendah. Ada 107.000.000 (28,7%) orang ibu hamil yang mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan sedangkan di Pulau Jawa sebesar 52,3% atau 355.873 ibu hamil trimester III yang mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah dan tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida dan multigravida trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 51 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil dengan kehamilan multigravida 72,5%, mayoritas tingkat kecemasan ibu hamil primigravida yaitu kecemasan sedang 64,3%, mayoritas tingkat kecemasan ibu hamil multigravida yaitu kecemasan sedang 51,4%. Diharapkan ibu hamil mempersiapkan diri secara fisik dan mental saat menghadapi persalinan, dan lebih sering memeriksakan kehamilannya untuk mengetahui kondisi ibu dan janinnya.

Kata Kunci : Kehamilan, Kecemasan.

Daftar Pustaka : 19 (2012-2022)/

**DIPLOMA-III NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

Scientific Paper, June 2022

Tasya Widya Salsabila

Overview of Anxiety Levels in Third Trimester Pregnant Women in Facing Childbirth in the Area of Tamansari Health Center, Tasikmalaya City

Xv + 74 pages + 5 tables + 1 chart + 11 appendices

ABSTRACT

Pregnancy and childbirth are threats to adulthood that can cause anxiety and stress. When stressed, the fetus absorbs the hormone cortisol, which is produced by the body of pregnant women. And children with high cortisol levels are more likely to develop allergies than children with low cortisol levels. There are 107,000,000 (28.7%) pregnant women who experience anxiety in facing childbirth, while on the island of Java 52.3% or 355,873 pregnant women in the third trimester who experience anxiety in facing childbirth. This study aimed to identify the amount and level of anxiety in third trimester primigravida and multigravida pregnant women in the area of Tamansari Tasikmalaya Health Center. This type of research was quantitative descriptive. The sampling technique used a total sampling of 51 respondents. The results showed that the majority of pregnant women with multigravida pregnancies were 72.5%, the majority of the anxiety levels of primigravida pregnant women were moderate anxiety 64.3%, the majority of the anxiety level of multigravida pregnant women was 51.4% moderate anxiety. It is hoped that pregnant women prepare themselves physically and mentally when facing childbirth, and check their pregnancy more often to find out the condition of the mother and fetus.

Keyword : Pregnancy, Anxiety

Bibliography : 19 (2012-2022)