

**FAKTOR PRESIPITASI SERANGAN ASMA PADA MAHASISWA
PRODI DIII KEPERAWATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

KARYA TULIS ILMIAH



**YUKI TRIANI
10119037**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

JULI 2022

**FAKTOR PRESIPITASI SERANGAN ASMA PADA MAHASISWA
PRODI DIII KEPERAWATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Keperawatan**



**YUKI TRIANI
10119037**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

JULI 2022

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, Juli 2022

Yuki Triani, Chita Widia, S.Pd., S.Kep.,M.KM, Asep Robby,Ns.,M.Kep

**Faktor Presipitasi Serangan Asma pada Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan
Universitas Bakti Tunas Husada**

xiv + 70 Halaman + 6 Tabel + 1 Bagan + 9 Lampiran

ABSTRAK

Asma awal mulanya merupakan penyakit keturunan yang diturunkan dari orang tua ke anak, namun sekarang ini faktor presipitasi seperti faktor lingkungan, faktor alergi, faktor psikologis dan faktor sosio-ekonomi dapat menjadi faktor serangan asma secara berulang. Serangan asma berulang terjadi karena sebagian besar mahasiswa penderita asma tidak mengetahui apa saja faktor presipitasi serangan asma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Presipitasi Serangan Asma pada Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan, Metode penelitian ini ialah kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 10 orang mahasiswa yang mempunyai menderita asma. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 responden sebagian besar yang memiliki faktor presipitasi serangan asma pada Prodi Keperawatan Universitas BTH terdapat pada perempuan sebanyak 9 orang (90%), dan pada laki-laki sebanyak 1 orang (1%), faktor serangan asma pada Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan akibat Sosio-Ekonomi sebanyak 3 orang (30%) dan 7 orang (70%) tidak mempunyai faktor serangan asma berdasarkan sosio-ekonomi, faktor serangan asma pada Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan akibat lingkungan sebanyak 7 orang (70%) dan 3 orang (30%) tidak mempunyai faktor serangan asma berdasarkan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Faktor presipitasi serangan asma pada mahasiswa prodi DIII Keperawatan penderita asma mayoritas berdasarkan lingkungan sebanyak 7 orang mahasiswa (70%) dan mayoritas terjadi pada perempuan sebanyak 9 orang mahasiswa (90%). Diharapkan institusi pendidikan membekali mahasiswa dengan menambah materi tentang Faktor presipitasi serangan asma dalam pembelajaran khususnya keperawatan medikal bedah.

Kata Kunci : Asma, Presipitasi, Serangan

Daftar Pustaka : 2012-2021

**D III NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

Scientific Writing, July 2022

Yuki Tiani, Chita Widia, S.Pd., S.Kep.,M.KM, Asep Robby,Ns.,M.Kep

***Precipitating Factors of Asthma Attacks in DIII Nursing Study Program Students,
Bakti Tunas Husada University***

xiv + 70 Page + 6 Table + 1 Chart + 9 Attachment

ABSTRACT

Asthma was originally a hereditary disease passed down from parents to children, but now precipitation factors such as environmental factors, allergy factors, psychological factors, socio-economic factors can be a factor in recurrent asthma attacks. Repeated asthma attacks occur because most students with asthma do not know what are the precipitating factors for asthma attacks. The purpose of this study was to determine the Precipitation Factors of Asthma Attacks in Nursing Diploma III students. The research method was quantitative with a descriptive research approach. The population in this study were 10 students who had asthma. The sampling technique used is by using total sampling. The results showed that of the 10 respondents most of whom had asthma attack precipitation factors in BTH University Nursing Study Program, there were 9 women (90%), and 1 person (1%), asthma attack factors in DIII Study Program students. There were 3 people (30%) and 7 people (70%) who did not have asthma attack factors based on socio-economic factors. Asthma attack factors in DIII Nursing Study Program students due to environmental factors were 7 people (70%) and 3 people (30%) did not have an asthma attack factor based on the environment. So, it can be concluded that the precipitating factor of asthma attacks in the DIII Nursing study program students with asthma is the majority based on the environment as many as 7 students (70%) and the majority occurs in women as many as 9 students (90%). It is hoped that educational institutions will equip students by adding material about the precipitation factor of asthma attacks in learning, especially medical-surgical nursing.

Keywords: Asthma, Precipitation, Attack

Bibliography : 2012-2021