

**HUBUNGAN ANTARA MEROKOK DENGAN MATA KERING
PADA MAHASISWA LAKI-LAKI TINGKAT DUA DI
UNIVERSITAS BTH TASIKMALAYA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Laporan Tugas Akhir Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Jenjang Pendidikan
Diploma III Refraksi Optisi**



**Namira Insani
40119008**

**PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
SEPTEMBER 2022**

**HUBUNGAN ANTARA MEROKOK DENGAN MATA KERING
PADA MAHASISWA LAKI-LAKI TINGKAT DUA DI
UNIVERSITAS BTB TASIKMALAYA**

LAPORAN TUGAS AKHIR



**Namira Insani
40119008**

**PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
SEPTEMBER 2022**

ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA MEROKOK DENGAN MATA KERING PADA MAHASISWA
LAKI-LAKI TINGKAT DUA DI UNIVERSITAS BTH TASIKMALAYA

Namira Insani
Refraksi Optisi, Universitas BTH

Latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara merokok terhadap mata kering pada mahasiswa laki-laki tingkat dua di Universitas BTH Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan rokok terhadap mata kering. Metode yang digunakan adalah analitik observasi dan desain penelitian *cross sectional study*. Dalam penelitian cross sectional, dijelaskan suatu penelitian variabel-variabel yang termasuk faktor risiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu sama (Notoatmodjo, 2014). **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa merokok tidak berhubungan dengan kejadian sindrom mata kering. Hal ini dihubungkan karena para responden belum lama mengkonsumsi rokok. Kelemahan penelitian ini tidak mencantumkan data lama merokok. **Kesimpulan** penelitian ini tidak ada hubungan antara frekuensi rokok dengan skrimer yakni dibuktikan dengan nilai probabilitas uji *Chi-Square* $0,143 > 0,05$ dan tidak ada hubungan antara frekuensi rokok dengan OSDI yakni dibuktikan dengan nilai probabilitas uji *Chi-Square* $0,722 > 0,05$.

Saran penelitian ini sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak lagi dan mencari faktor resiko yang berhubungan dengan mata kering, bagi peneliti lain diharapkan dari hasil penelitian dijadikan dasar untuk meningkatkan hubungan rokok terhadap mata kering, pengkonsumsi rokok diharapkan sering melakukan pemeriksaan mata apabila mengalami mata kering

Kata kunci : mata kering, merokok

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING AND DRY EYES IN GRADE TWO MALE STUDENTS AT BTH TASIKMALAYA UNIVERSITY

Namira Insani

Refraksionis Optisien, BTH UNIVERSITY

The background of the research is to formulate the problem, namely whether there is a relationship between smoking and dry eyes in second year male students at BTH University Tasikmalaya. The purpose of this study was to determine the relationship between smoking and dry eyes. **The method** used is analytic observation and research design is cross sectional study. In a cross-sectional study, a study of variables including risk factors and variables including effects were explained at the same time (Notoatmodjo, 2014). **The results** of this study indicate that smoking is not associated with the incidence of dry eye syndrome. This is because the respondents have not consumed cigarettes for a long time. The weakness of this study did not include data on the length of smoking. **The conclusion** of this study is that there is no relationship between the frequency of cigarettes and the scrimmer, which is indicated by the probability value of the Chi-Square test of $0.143>0.05$ and there is no relationship between the frequency of cigarettes and the OSDI, which is evidenced by the probability value of the Chi-Square test of $0.722>0.05$.

Suggestions for this study are to use more samples and look for risk factors related to dry eyes, for other researchers, it is hoped that the results of this study will be used as a basis for increasing the relationship between smoking and dry eyes.

Keywords: dry eyes, smoking