

**TINGKAT KETERGANTUNGAN PASIEN STROKE DI  
RUANG 2B MELATI RUMAH SAKIT dr. SOEKARDJO  
KOTA TASIKMALAYA**

**KARYA TULIS ILMIAH**



**ERI TRIANA RAMADHAN  
10119017**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA  
JULI 2022**

**PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2022

Eri Triana Ramadhan

**Tingkat Ketergantungan Pasien Stroke di Ruangan Melati 2B RSUD dr.  
Soekardjo Kota Tasikmalaya**

xiv + 40 Halaman + 3 Tabel + 1 Bagan + 10 Lampiran

**ABSTRAK**

Stroke merupakan gangguan fungsional otak akut fokal maupun global yang diakibatkan oleh terhambatnya peredaran darah ke otak yang dimana terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga suplai oksigen dan zat makanan jadi terganggu. Stroke dibagi menjadi dua yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien stroke di ruangan Melati 2B RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan populasi penderita stroke di ruangan melati 2B RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Teknik sampling menggunakan *Accidental sampling* menggunakan lembar kuesioner. Responden yang diperoleh yaitu klien dengan stroke sebanyak 5 responden. Jenis kelamin laki-laki 3 responden (60%) dan perempuan 2 responden (40%). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 responden dengan tingkat ketergantungan partial care (60%), responden dengan tingkat ketergantungan total care sebanyak 2 responden (40%), sedangkan responden dengan tingkat ketergantungan minimal care tidak ada.

**Kata Kunci :** Stroke, Tingkat Ketergantungan

**Daftar Pustaka :** (2013-2022)

**D-III NURSING STUDY PROGRAM  
FACULTY OF NURSING SCIENCE  
Bakti TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

*Scientific Writing, June 2022*

*Eri Triana Ramadhan*

***Level of Dependence of Stroke Patients in Melati Room 2B RSUD dr.  
Soekardjo, Tasikmalaya City***

***xiv + 40 Pages + 3 Tables + 1 Chart + 10 Appendices***

***ABSTRACT***

*Stroke is an acute focal or global brain functional disorder caused by obstruction of blood circulation to the brain where there is blockage or rupture of blood vessels in the brain, so that the supply of oxygen and nutrients is disrupted. Stroke is divided into two, namely ischemic stroke and hemorrhagic stroke. The purpose of this study was to identify the level of dependence of stroke patients in Melati Room 2B RSUD dr. Soekardjo, City of Tasikmalaya. This research method is descriptive quantitative with a population of stroke patients in room jasmine 2B RSUD dr. Soekardjo, City of Tasikmalaya. The sampling technique used accidental sampling using a questionnaire sheet. Respondents obtained are clients with stroke as many as 5 respondents. Male gender 3 respondents (60%) and female 2 respondents (40%). The results of this study indicate that there are 3 respondents with a dependency level for partial care (60%), respondents with a dependency level for total care as many as 2 respondents (40%), while respondents with a minimum dependency level for care do not exist.*

***Keywords:*** *Level of Addiction, Stroke*

***Bibliography :*** (2013-2022)