

**PEMBERIAN MINYAK ZAITUN TERHADAP PENURUNAN
RUAM POPOK PADA BAYI USIA 1-12 BULAN
DI WILAYAH KELURAHAN KAHURIPAN
KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH



**AMILA MISYA FARIZAH
NIM : 10120100**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
2023**

**PEMBERIAN MINYAK ZAITUN TERHADAP PENURUNAN
RUAM POPOK PADA BAYI USIA 1-12 BULAN
DI WILAYAH KELURAHAN KAHURIPAN
KOTA TASIKMALAYA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Keperawatan

KARYA TULIS ILMIAH



**AMILA MISYA FARIZAH
NIM : 10120100**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
2023**

**PROGRAM STUDI D III KEPRAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2023

Amila Misya Farizah

**Pemberian Minyak Zaitun Terhadap Penurunan Ruam Popok Pada Bayi
Usia 1-12 Bulan Di Wilayah Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya**

xii + 68 halaman + 19 tabel + 16 lampiran

ABSTRAK

Ruam popok (*Diaper Rash*) merupakan masalah kulit yang ditandai dengan kemerahan pada daerah yang tertutup oleh popok yang umum terjadi pada bayi atau anak-anak. Ruam popok mempengaruhi kesehatan kulit perineum bayi, dan dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan bayi. Salah satu tindakan atau terapi alternatif untuk mengatasi ruam popok adalah mengoleskan minyak zaitun. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui hasil/respon pemberian minyak zaitun terhadap penurunan ruam popok pada bayi usia 1-12 bulan di Wilayah Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah subyek sebanyak 2 orang dengan kasus yang sama yaitu ruam popok dengan masalah gangguan integritas kulit. Lama pengambilan data 3 hari berturut-turut. Instrumen studi kasus yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian minyak zaitun, lembar observasi dan lembar wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif tidak terstruktur yang disajikan dalam bentuk narasi. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa setelah pemberian minyak zaitun didapatkan pada hari pertama dan hari ke dua, derajat ruam popok subjek I berada pada kategori ringan (terdapat kemerahan kecil dan lecet), sedangkan pada subjek II berada pada kategori sedang terdapat kemerahan dan lecet pada permukaan luas). Pada hari ke tiga terdapat perubahan derajat ruam popok masing-masing subjek dimana ruam popok subjek I sembuh sedangkan subjek II derajat ruam popok menjadi ringan. Kesimpulan yaitu adanya perbedaan respon pemberian minyak zaitun pada setiap subyek, tetapi respon akhirnya derajat ruam popok membaik. Saran bagi orang tua yaitu dapat menggunakan minyak zaitun sebagai terapi alternatif untuk mencegah dan mengatasi ruam popok pada bayi.

Kata Kunci : Bayi, Minyak Zaitun, Ruam Popok
Daftar Pustaka : 17 buah (2013 – 2022)

**D III NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

Scientific Paper, June 2023

Amila Misya Farizah

***Application Of Olive Oil To Reduce Diaper Rash In Infants 1-12 Months In
The Kahuripan Subdistrict, Tasikmalaya City***

xii + 68 pages + 19 tables + 16 appendices

ABSTRACT

Diaper rash is a skin problem characterized by redness of the areas covered by diapers that are common in infants or children. Diaper rash affects the health of the baby's perineal skin, and can adversely affect the growth and development of the baby. One of the actions or alternative therapies to deal with diaper rash is to apply olive oil. The purpose of this case study was to identify the result/response of giving olive oil to a decrease in diaper rash in infants aged 1-12 months in the Kahuripan Village Region, Tasikmalaya City. The design of this research was descriptive qualitative with a case study approach. The number of subjects were 2 people with the same case, namely diaper rash with impaired skin integrity. Duration of data collection was 3 consecutive days. The case study instruments were Standard Operating Procedures (SOP) for giving olive oil, observation sheets and interview sheets. Data analysis used an unstructured qualitative approach presented in narrative form. The results of the case study showed that after application of olive oil, on the first and second day, the degree of diaper rash in subject I was in the mild category, which there were small redness and blisters, while in subject II, it was in the moderate category, which there was intense redness and blisters on a broad surface. On the third day there was a change in the degree of diaper rash for each subject. Subject I experienced diaper rash recovered while the degree of diaper rash on subject II became mild. The conclusion is that there are differences in the response of giving olive oil to each subject, but the final response is the degree of diaper rash improves. It is recommended for the parents to provide sufficient time (2-3 hours) before wearing next diaper to facilitate drying on the baby's skin after cleansing. The parents can use olive oil as an alternative therapy to prevent diaper rash

Keywords : Infans, Olive Oil, Diaper Rash

Bibliography : 17 Pieces (2013 – 2022)