

**HUBUNGAN INTENSITAS MEROKOK DENGAN KUALITAS
HIDUP PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RSUD KOTA
BANJAR**

SKRIPSI



**HERA AULIADEWI
10016122032**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

ABSTRAK

HUBUNGAN INTENSITAS MEROKOK DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RSUD KOTA BANJAR

Hera Auliadewi

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit infeksi dengan angka kejadian tinggi yang dapat dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, sehingga berdampak pada kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas merokok dengan kualitas hidup pasien TB paru di RSUD Kota Banjar. Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional pada pasien TB paru periode Januari-Maret 2026. Intensitas merokok diukur menggunakan kuesioner GATS diukur dengan Indeks Brinkman, sedangkan kualitas hidup menggunakan FACIT-TB. Analisis data dilakukan dengan uji Spearman. Hasil menunjukkan terdapat hubungan antara intensitas merokok dengan kualitas hidup pasien, di mana semakin tinggi intensitas merokok maka semakin rendah kualitas hidup.

Kata kunci: Tuberkulosis paru, intensitas merokok, kualitas hidup

ABSTRACT

Pulmonary tuberculosis (TB) is an infectious disease with a high incidence rate, which can be influenced by smoking habits and may affect patients' quality of life. This study aimed to determine the relationship between smoking intensity and the quality of life of pulmonary TB patients at RSUD Kota Banjar. This study employed a descriptive analytic design with a cross-sectional approach involving pulmonary TB patients during January–March 2026. Smoking intensity was measured using the Global Adult Tobacco Survey (GATS) and calculated using the Brinkman Index, while quality of life was assessed using the FACIT-TB instrument. Data were analyzed using the Spearman test. The results showed that there was a relationship between smoking intensity and patients' quality of life, where higher smoking intensity was associated with lower quality of life.

Keywords: *Pulmonary tuberculosis, smoking intensity, quality of life*