

**PERBANDINGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN
TUBERKULOSIS PARU DAN EFEK SAMPING PADA ANAK
DI WILAYAH PUSKESMAS CIGEUREUNG TAHUN 2025**

SKRIPSI



PUSPA VIRGIANTIKA ADZKIA PUTRI

10016224223

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JANUARI 2026**

**PERBANDINGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN
TUBERKULOSIS PARU DAN EFEK SAMPING PADA ANAK
DI WILAYAH PUSKESMAS CIGEUREUNG TAHUN 2025**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi**



**PUSPA VIRGIANTIKA ADZKIA PUTRI
10016224223**

**PROGRAM STUDI RPL S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JANUARI 2026**

ABSTRAK

Perbandingan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis Paru Dan Efek Samping Pada Anak Di wilayah Puskesmas Cigeureung Tahun 2025

Puspa Virgiantika Adzkia Putri

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Latar Belakang: Tuberkulosis merupakan penyakit akibat *Mycobacterium tuberculosis*. Jawa Barat tercatat Tuberkulosis anak tertinggi di Indonesia. Tujuan: Mengetahui perbandingan kepatuhan minum obat pasien Tuberkulosis paru anak dan efek samping di Puskesmas Cigeureung tahun 2025. Metode: Menggunakan desain kuantitatif deskriptif cross-sectional. Data diperoleh melalui kuesioner MMAS-8 dan ADR, dianalisis SPSS Fisher Exact dan Spearman's. Hasil: responden (93,3%) kepatuhan tinggi, berusia 3–7 tahun (83,3%), laki-laki (53,3%). Efek samping ringan (93,3%) dengan proporsi seimbang laki-laki dan perempuan. Uji Fisher Exact $p=1,000$, Spearman's $p=0,708$ membuktikan tidak ada hubungan signifikan. Kesimpulan: Kepatuhan tidak berhubungan signifikan dengan efek samping tuberkulosis paru anak di Puskesmas Cigeureung.

Kata Kunci: Kepatuhan, Tuberkulosis, Anak, Efek Samping.

Abstract

*Background: Tuberculosis is a disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*. West Java has the highest number of childhood tuberculosis cases in Indonesia. Objective: To compare medication adherence and side effects of pediatric pulmonary tuberculosis patients at the Cigeureung Community Health Center in 2025. Method: Using a quantitative descriptive cross-sectional design. Data were obtained through the MMAS-8 and ADR questionnaires, analyzed using SPSS Fisher Exact and Spearman's. Results: Respondents (93.3%) had high adherence, aged 3–7 years (83.3%), and males (53.3%). Mild side effects (93.3%) with a balanced proportion of males and females. Fisher Exact test $p=1.000$, Spearman's $p=0.708$ showed no significant relationship. Conclusion: Compliance was not significantly related to side effects of pediatric pulmonary tuberculosis at the Cigeureung Community Health Center.*

Keyword: *Compliance, Tuberculosis, Children, Side Effects.*