

**ANALISIS FARMAKOEPIDEMIOLOGI PENGGUNAAN
OBAT ANTIRETROVIRAL BERDASARKAN PEDOMAN
NASIONAL DAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN HIV
DI RSUD Dr. SOEKARDJO**

SKRIPSI



**MENTARI NURUL SUKMA
10016122020**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

**ANALISIS FARMAKOEPIDEMIOLOGI PENGGUNAAN OBAT
ANTIRETROVIRAL BERDASARKAN PEDOMAN NASIONAL DAN
TINGGKAT KEPATUHAN PASIEN HIV
DI RSUD Dr. SOEKARDJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Farmasi



**MENTARI NURUL SUKMA
10016122020**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

ABSTRAK

Analisis Farmakoepidemiologi Penggunaan Obat Antiretroviral Berdasarkan Pedoman Nasional dan Tingkat Kepatuhan Pasien HIV di RSUD Dr. Soekardjo

Mentari Nurul Sukma

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Abstrak

HIV/AIDS memerlukan terapi antiretroviral (*antiretroviral*) yang tepat dan berkelanjutan untuk menekan progresivitas penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penggunaan ARV berdasarkan pedoman nasional dan tingkat kepatuhan pasien HIV di RSUD Dr. Soekardjo. Desain penelitian menggunakan *cross-sectional* pada 360 pasien dengan analisis uji Chi-Square. Hasil menunjukkan 92,8% terapi sesuai pedoman dan 72,5% pasien tergolong patuh. Terdapat hubungan signifikan antara kesesuaian terapi dan kepatuhan ($p=0,005$). Kesimpulan menunjukkan kesesuaian terapi berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien HIV.

Kata Kunci: HIV/AIDS, antiretroviral, farmakoepidemiologi, kepatuhan

Abstract

HIV/AIDS requires appropriate and continuous antiretroviral therapy to suppress disease progression and improve patients' quality of life. This study aimed to analyze the appropriateness of ARV use based on national guidelines and the level of adherence among HIV patients at Dr. Soekardjo Hospital. A cross-sectional design was conducted on 360 patients, and data were analyzed using the Chi-Square test. The results showed that 92.8% of therapies were in accordance with the guidelines and 72.5% of patients were adherent. A significant association was found between therapy appropriateness and patient adherence ($p=0.005$). In conclusion, appropriate ARV use contributes to improved adherence among HIV patients.

Keywords: HIV/AIDS, antiretroviral, pharmacoepidemiology, adherence