

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN
PENGUNAAN OBAT PADA PASIEN DIABETES MELITUS
TIPE 2 DI RAWAT JALAN RSUD CIAMIS**

SKRIPSI



**HANIF AZHAR ZAIDAN
10016122009**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN
PENGUNAAN OBAT PADA PASIEN DIABETES MELITUS
TIPE 2 DI RAWAT JALAN RSUD CIAMIS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi**



HANIF AZHAR ZAIDAN

10016122009

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

ABSTRAK

Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Penggunaan Obat pada Pasien Diabetes

Melitus Tipe 2 di Rawat Jalan RSUD CIAMIS

Hanif Azhar Zaidan

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengetahuan, kepatuhan penggunaan obat, serta hubungannya pada 85 pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di rawat jalan RSUD Ciamis. Penelitian observasional analitik berdesain *cross-sectional* ini menggunakan instrumen DKQ-24 dan MMAS-8. Hasil menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang (60,0%) dan kepatuhan sedang (60,0%). Uji *Chi-Square* menghasilkan *p-value* 0,844 ($p > 0,05$), menandakan tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan minum obat. Kepatuhan bersifat multifaktorial yang lebih dipengaruhi motivasi, kejenuhan terapi, dan dukungan keluarga, sehingga edukasi perlu dikombinasikan dengan intervensi perilaku yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Kepatuhan Penggunaan Obat, Tingkat Pengetahuan, MMAS-8, DKQ-24, RSUD Ciamis.

Abstract

This study aimed to analyze knowledge level, medication adherence, and their relationship among 85 outpatient type 2 diabetes mellitus patients at RSUD Ciamis. This observational analytic study with a cross-sectional design utilized DKQ-24 and MMAS-8 questionnaires. Results revealed that the majority of respondents had low knowledge levels (60.0%) and moderate adherence (60.0%). The Chi-Square test yielded a p-value of 0.844 ($p > 0.05$), indicating no significant relationship between knowledge level and medication adherence. Adherence is multifactorial, heavily influenced by motivation, treatment fatigue, and family support, suggesting that education must be integrated with continuous behavioral interventions

Keywords: *Type 2 Diabetes Mellitus, Medication Adherence, Knowledge Level, MMAS-8, DKQ-24, RSUD Ciamis.*