

**PENGARUH PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK
TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN PADA PENYAKIT
DIABETES MELITUS DENGAN KOMPLIKASI HIPERTENSI
DI RS JHC TASIKMALAYA**

SKRIPSI



REGITA PUTRI CAHYANI

10016122244

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

**PENGARUH PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK
TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN PADA PENYAKIT
DIABETES MELITUS DENGAN KOMPLIKASI HIPERTENSI
DI RUMAH SAKIT JHC TASIKMALAYA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi**



**REGITA PUTRI CAHYANI
10016122244**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2026**

ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN PADA PENYAKIT DIABETES MELITUS DENGAN KOMPLIKASI HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT JHC TASIKMALAYA

Regita Putri Cahyani

Program studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Abstrak

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi, salah satunya hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan obat antidiabetik terhadap kualitas hidup pasien di Rumah Sakit JHC Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode *retrospective cohort* dan *cross sectional*. Pengambilan data dilakukan secara retrospektive melalui data rekam medis dan pengisian kuesioner WHOQOL-BREF, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pasien memiliki kualitas hidup kategori sedang sebanyak 45 responden (79%). Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan nilai 0,797 ($p > 0,05$). Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan signifikan antara penggunaan obat antidiabetik dengan kualitas hidup pasien.

Kata Kunci: Diabetes Melitus, Hipertensi, Kualitas Hidup, Obat Antidiabetik.

Abstract

Diabetes mellitus is a chronic disease that can lead to various complications, one of which is hypertension. This study aims to determine the relationship between the use of antidiabetic drugs and the quality of life of patients at JHC Hospital in Tasikmalaya City. This study used a descriptive observational method with a cross-sectional approach. Data collection was conducted retrospectively through medical records and the completion of the WHOQOL-BREF questionnaire; the data obtained were then analyzed using the Chi-Square test. The results showed that the majority of patients had a moderate quality of life, with 45 respondents (79%) falling into this category. The Chi-Square test yielded a value of 0.797 ($p > 0.05$). In conclusion, there was no significant association between the use of antidiabetic medications and patients' quality of life.

Keywords: Diabetes Mellitus, Hypertension, Quality Of Life, Antidiabetic Drugs.