

**KARAKTERISTIK PASIEN AMBLIOPIA DI KLINIK MATA
PUSPA SERUNI TASIKMALAYA PADA BULAN JANUARI-
MARET TAHUN 2026**

KARYA TULIS ILMIAH



SITI NURIAH

11045123010

**PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

**KARAKTERISTIK PASIEN AMBLIOPIA DI KLINIK MATA
PUSPA SERUNI TASIKMALAYA PADA BULAN JANUARI-
MARET TAHUN 2026**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma III
Refraksi Optisi**



**SITI NURIAH
11045123010**

**PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

ABSTRAK

KARAKTERISTIK PASIEN AMBLIOPIA DI KLINIK MATA PUSPA SERUNI TASIKMALAYA PADA BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2026

Siti Nuriah

Program Studi DIII Refraksi Optisi Universitas Bakti Tunas Husada

Abstrak

Ambliopia merupakan gangguan perkembangan sistem visual yang menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan tanpa disertai kelainan struktural pada mata dan dapat menetap hingga dewasa jika tidak ditangani sejak dini. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik pasien ambliopia di Klinik Mata Puspa Seruni Tasikmalaya periode Januari–Maret 2026. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain retrospektif terhadap 111 rekam medis yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil menunjukkan mayoritas pasien berjenis kelamin perempuan (57,66%), berusia 20–59 tahun (37,84%), mengalami ambliopia ringan (55,86%), serta didominasi jenis ambliopia isoametropia (70,27%).

Kata kunci: Ambliopia, karakteristik pasien, derajat ambliopia.

Abstract

Amblyopia is a developmental disorder of the visual system that causes reduced visual acuity without any structural abnormalities of the eye and may persist into adulthood if left untreated early. This study aimed to determine the characteristics of patients with amblyopia at Puspa Seruni Eye Clinic, Tasikmalaya, during the period of January–March 2026. This study employed a quantitative descriptive method with a retrospective design using 111 medical records selected through purposive sampling. Data were analyzed descriptively using frequency distributions and percentages. The results showed that most patients were female (57.66%), aged 20–59 years (37.84%), had mild amblyopia (55.86%), and predominantly had isoametropic amblyopia (70.27%).

Keywords: Amblyopia, patient characteristics, severity of amblyopia.