

**FAKTOR DETERMINAN *DROP OUT* PENGOBATAN TUBERKULOSIS**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Keperawatan**

**Disusun Oleh :**

**FARIZ FAUZI ABDILAH**

**NIM : 10117058**



**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
BAKTI TUNAS HUSADA  
TASIKMALAYA  
2020**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR DETERMINAN *DROP OUT* PENGOBATAN TUBERKULOSIS**

**Fariz Fauzi Abdilah<sup>1</sup>, Chita Widia<sup>2</sup>, Teti Agustin<sup>3</sup>**

Program Studi D III Keperawatan, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Micobakterium Tuberkulosis* yang bisa menyebar lewat percikan droplet penderita. Drop Out adalah keadaan dimana penderita tuberkulosis yang berhenti melakukan terapi pengobatan karena alasan tertentu. Faktor yang melatar belakangi terjadinya drop out diantaranya pendidikan, jarak rumah kefasilitas kesehatan,motivasi dan efeksamping obat. Tujuan telaah literatur untuk mengidentifikasi konsep/ teori atau hasil – hasil penelitian tentang faktor determinan drop out pengobatan tuberkulosis .Jenis penelitian adalah telaah literatur.Sumber yang digunakan sumber primer yaitu menggunakan artikel sebanyak 10 buah. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan terhadap terjadinya drop out pengobatan tuberkulosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, faktor jarak rumah kefasilitas kesehatan, faktor motivasi dan faktor efek samping obat dirasakan sangat berpengaruh terhadap timbulnya drop out pengobatan tuberkulosis. Sedangkan faktor yang kurang berpengaruh terhadap drop out pengobatan tuberkulosis adalah usia dan jenis kelamin dikarenakan hal ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dirubah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan oleh institusi pelayanan kesehatan untuk menekan angka kejadian *drop out* tuberkulosis dan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa agar dapat mengaplikasikan pencegahan terjadinya drop out pengobatan tuberkulosis dan menjadi bahan acuan untuk penelitian tentang faktor determinan drop out pengobatan tuberkulosis yang lebih mendalam

**Kata kunci:**Faktor Determinan Drop Out pengobatan Tuberkulosis

*Tuberculosis is an infectious disease caused by Micobacterium Tuberculosis which can be spread by droplets splashing patients. Drop Out is a condition where tuberculosis sufferers who stop taking medication for some reason. Factors underlying the occurrence of drop outs include education, distance from home to health facilities, motivation and drug effectiveness. The purpose of the literature review is to identify concepts / theories or results of research on the determinants of drop out tuberculosis treatment. This type of research is literature review. Sources used are primary sources, namely using as many as 10 articles. The results of this study illustrate that there is a significant influence on the occurrence of tuberculosis treatment drop outs. The results showed that the factors of education, the factor of home distance to health facilities, motivational factors and side effects of the drug were felt to be very influential on the emergence of tuberculosis treatment. Whereas the less significant factor affecting tuberculosis treatment drop out is age and sex because this is an unavoidable and irreversible thing. It is hoped that this research can be a reference by health service institutions to reduce the number of tuberculosis drop outs and increase the success rate of tuberculosis treatment. In addition, this research can be an information material for students to apply prevention of tuberculosis treatment drop outs and to be a reference material for research on determinant factors drop out of tuberculosis treatment more deeply*

**Keywords:***Determinants of Drop Out Treatment for Tuberculosis*